

SOLUTION DE BASE À CE ÉLEVÉE POUR LE PROGRAMME D'ALIMENTATION EN POUDRE FLORAPRO®		Propagation	Végétative	Floraison précoce	Floraison moyenne	Floraison tardive	Fin de la floraison
Fréquence d'alimentation en mL/gal Utiliser 1 lb/gallon de solution de base concentrée	Ca + micronutriments FloraPro®	7,0	31,0	30,0	28,5	19,0	12,5
	Croissance FloraPro®	9,0	38,0	–	–	–	–
	Floraison FloraPro®	–	–	33,0	25,5	15,0	–
	Floraison tardive FloraPro®	–	–	12,5	21,0	26,0	32,0
0,028% HOCL		3	4	4	4	4	4 - 9
	Azote (ppm)	60	250	210	185	115	50
	pH cible	5,5 - 5,8	5,6 - 6,1	5,7 - 6,2			
	CE (mS/cm)	0,6 - 0,8	2,5 - 2,7	2,6 - 2,8	2,4 - 2,6	1,9 - 2,1	1,5 - 1,7

Il est fortement recommandé d'utiliser une chambre de mélange entre l'injection de Ca + micronutriments et les autres apports de base

Coco et matelas de laine de roche

SOLUTION DE BASE À CE ÉLEVÉE POUR LE PROGRAMME D'ALIMENTATION EN POUDRE FLORAPRO®		Propagation	Végétative			Floraison précoce			Floraison moyenne			Floraison tardive		Fin de la floraison
		Sem. 1	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9
Fréquence d'alimentation en mL/gal Utiliser 1 lb/gallon de solution de base concentrée	Ca + micronutriments FloraPro®	7,0	31,0	31,0	31,0	30,0	30,0	30,0	28,5	28,5	28,5	19,0	19,0	12,5
	Croissance FloraPro®	9,0	38,0	38,0	38,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Floraison FloraPro®	–	–	–	–	33,0	33,0	33,0	25,5	25,5	25,5	15,0	15,0	–
	Floraison tardive FloraPro®	–	–	–	–	12,5	12,5	12,5	21,0	21,0	21,0	26,0	26,0	32,0
0,028% HOCL		3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 - 9
	Azote (ppm)	60	250	250	250	210	210	210	185	185	185	115	115	50
	pH cible	5,5 - 5,8	5,6 - 6,1			5,7 - 6,2								
	CE (mS/cm)	0,6 - 0,8	2,4 - 2,6			2,6 - 2,8			2,4 - 2,6			1,9 - 2,1		1,5 - 1,7