

SOLUTION DE BASE STANDARD POUR LE PROGRAMME D'ALIMENTATION EN POUDRE FLORAPRO®		Propagation	Végétative	Floraison précoce	Floraison moyenne	Floraison tardive	Fin de la floraison
Fréquence d'alimentation en mL/gal Utiliser 1 lb/gallon de solution de base concentrée	Ca + micronutriments FloraPro®	7,0	30,0	30,0	26,5	18,5	12,5
	Croissance FloraPro®	9,0	35,0	–	–	–	–
	Floraison FloraPro®	–	–	31,5	27,5	15,5	–
	Floraison tardive FloraPro®	–	–	8,0	14,0	24,0	29,0
0,028% HOCL		3	3	3	3	3	3 - 9
	Azote (ppm)	60	240	200	180	115	50
	pH cible	5,5 - 5,8	5,6 - 6,1	5,7 - 6,2			
	CE (mS/cm)	0,6 - 0,8	2,3 - 2,5	2,4 - 2,6	2,3 - 2,5	1,9 - 2,1	1,3 - 1,5

Il est fortement recommandé d'utiliser une chambre de mélange entre l'injection de Ca + micronutriments et les autres apports de base

Coco et matelas de laine de roche

SOLUTION DE BASE STANDARD POUR LE PROGRAMME D'ALIMENTATION EN POUDRE FLORAPRO®		Propagation	Végétative			Floraison précoce			Floraison moyenne			Floraison tardive		Fin de la floraison
		Sem. 1	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9
Fréquence d'alimentation en mL/gal Utiliser 1 lb/gallon de solution de base concentrée	Ca + micronutriments FloraPro®	7,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	26,5	26,5	26,5	18,5	18,5	12,5
	Croissance FloraPro®	9,0	35,0	35,0	35,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Floraison FloraPro®	–	–	–	–	31,5	31,5	31,5	27,5	27,5	27,5	15,5	15,5	–
	Floraison tardive FloraPro®	–	–	–	–	8,0	8,0	8,0	14,0	14,0	14,0	24,0	24,0	29,0
0,028% HOCL		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 - 9
	Azote (ppm)	60	240	240	240	200	200	200	180	180	180	115	115	50
	pH cible	5,5 - 5,8	5,6 - 6,1			5,7 - 6,2								
	CE (mS/cm)	0,6 - 0,8	2,3 - 2,5			2,4 - 2,6			2,3 - 2,5			1,9 - 2,1		1,3 - 1,5