

CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG DẠNG BỘT FLORAPRO® TIÊU CHUẨN			Nhân giống	Sinh trưởng	Đầu giai đoạn ra hoa	Giữa giai đoạn ra hoa	Cuối giai đoạn ra hoa	Trước thu hoạch
Tỷ lệ dinh dưỡng (mL/gal) Sử dụng dung dịch gốc đậm đặc với tỷ lệ 1,0 lb/gallon	Thứ tự trộn ↓	FloraPro® Canxi + Dinh dưỡng vi lượng	7,0	30,0	30,0	26,5	18,5	12,5
		FloraPro® Sinh trưởng	9,0	35,0	-	-	-	-
		FloraPro® Ra hoa	-	-	31,5	27,5	15,5	-
		FloraPro® Cuối giai đoạn ra hoa	-	-	8,0	14,0	24,0	29,0
0,028% HOCL		TrueFlo (mL/gal)	3	3	3	3	3	3 – 9
		Nitơ (ppm)	60	240	200	180	115	50
		pH đích	5,5 – 5,8	5,6 – 6,1	5,7 – 6,2			
		Độ dẫn điện (mS/cm)	0,6 – 0,8	2,3 – 2,5	2,4 – 2,6	2,3 – 2,5	1,9 – 2,1	1,3 – 1,5

Khuyến nghị nên sử dụng buồng trộn giữa bước bơm Canxi + Dinh dưỡng vi lượng và các dung dịch kiềm khác

Xơ dừa & bông khoáng

CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG DẠNG BỘT FLORAPRO® TIÊU CHUẨN		Nhân giống	Sinh trưởng				Đầu giai đoạn ra			Giữa giai đoạn ra hoa			Cuối giai đoạn ra hoa		Trước thu hoạch
		Tuần 1	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6	Tuần 7	Tuần 8	Tuần 9	
Tỷ lệ dinh dưỡng (mL/gal) Sử dụng dung dịch gốc đậm đặc với tỷ lệ 1,0 lb/gallon	FloraPro® Canxi + Dinh dưỡng vi lượng	7,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	26,5	26,5	26,5	18,5	18,5	12,5	
	FloraPro® Sinh trưởng	9,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	FloraPro® Ra hoa	-	-	-	-	31,5	31,5	31,5	27,5	27,5	27,5	15,5	15,5	-	
	FloraPro® Cuối giai đoạn ra hoa	-	-	-	-	8,0	8,0	8,0	14,0	14,0	14,0	24,0	24,0	29,0	
0,028% HOCL	TrueFlo (mL/gal)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3 – 9	
	Nitơ (ppm)	60	240	240	240	200	200	200	180	180	180	115	115	50	
	pH đích	5,5 – 5,8	5,6 – 6,1			5,7 – 6,2									
	Độ dẫn điện (mS/cm)	0,6 – 0,8	2.3 – 2,5			2,4 – 2,6			2,3 – 2,5			1,9 – 2,1		1,3 – 1,5	