

ملصق بيان جدول التسميد

جدول التسميد بمخబبات FLORAPRO® في خزانات التسميد اليومية أو المستودعات

التزهير (12 ساعة)		النمو (18 ساعة)	الفترة الضوئية
التزهير المتأخر	التزهير المبكر	الخضروات	مرحلة النمو
3-4	3-4	2-4	المدة (بالأسابيع)
1.4	1.5	1.6	EC مرجع
120	135	170	إجمالي النيتروجين المستهدف (جزء في المليون)
1.8	2.5	2.5	كالسيوم + مكرويات 0-0-14 FP
0	0	3.2	النمو 10-22 FP (جرام/ غالون)
2.9	2.7	0	التزهير 7-27 FP (جرام/ غالون)

FLORAPRO® 1 رطل/ غالون، جدول تخفيف المحلول الأساسي

كالسيوم + مكرويات 0-0-14 FP	1.0 رطل/ غالون	A
النمو 10-22 FP	1.0 رطل/ غالون	B
التزهير 7-27 FP	1.0 رطل/ غالون	C

لا تمزج أبداً مخబبات في FloraPro الخزان المركز الواحد، لأنه سيحدث ترسب

FLORAPRO® 1 رطل/ غالون، جدول التسميد التجاري: لحاقدنات المخصب

التزهير (12 ساعة)		النمو (18 ساعة)	الفترة الضوئية
التزهير المتأخر	التزهير المبكر	الخضروات	مرحلة النمو
3-4	3-4	2-4	المدة (بالأسابيع)
1.4	1.5	1.6	EC مرجع
120	135	170	إجمالي النيتروجين المستهدف (جزء في المليون)
15	20	20	كالسيوم + مكرويات 0-0-14 FP (ملييلتر/ غالون)
0	0	26	النمو 10-22 FP (ملييلتر/ غالون)
24	22	0	التزهير 7-27 FP (ملييلتر/ غالون)

جدوال التسميد هي توصيات فحسب. وربما يستلزم الأمر تعديلات بناءً على الظروف البيئية، والحالة الفردية للنمو، واستخدام منتجات إضافية. وقد تختلف النتائج